


ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

Τα εκκρίματα των ενδοκρινών αδένων ονομάζονται **ορμόνες**. Οι Ορμόνες είναι χημικές ουσίες οι οποίες εκκρίνονται από τους ενδοκρινείς αδένες.


Στοχεύουν όπους ιστούς ή στα όργανα με σκοπό

- να διεγείρουν ή
- να αναστείλουν κάποια λειτουργία τους.



Ο οργανισμός του ανθρώπου
έχει επτά ενδοκρινείς αδένες:

- Υπόφυση
- Θυρεοειδής αδένας
- Παραθυρεοειδείς αδένες
- Επινεφρίδια
- Ωοθήκες
- Όρχεις
- Νησίδια του παγκρέατος





Θυρεοειδής αδένας

Είναι ένας από τους σημαντικότερους ενδοκρινείς αδένες γιατί έχει σχέση με την κανονική ανάπτυξη του σώματος.

Παράγει τις ορμόνες:

- ✓ Θυροξίνη (T_4)
- ✓ Τριϊωδοθυρονίνη (T_3)



Η παραγωγή και η έκκριση των ορμονών αυτών ρυθμίζεται από την θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (TSH) η οποία εκκρίνεται από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης.


Παραθυρεοειδείς αδένες

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι **τέσσερες** και βρίσκονται ανά δύο πίσω στους λοβούς του θυρεοειδή αδένα.

Έχουν μέγεθος γύρω στα 4-6 χιλ.


Ζυγίζουν 35 χιλιοστόγραμμα ο καθένας.

Ρυθμίζουν τον **μεταβολισμό του ασβεστίου** και του **φωσφόρου** του οργανισμού.



Εκκρίνουν την **παραθορμόνη** μια ορμόνη πρωτεΐνικής σύνθεσης.


- ❖ Η έκκριση της παραθορμόνης ρυθμίζεται από την πυκνότητα του **ιοντικού ασβεστίου (Ca^{++})** του αίματος.
- ❖ **Ελάττωση** της πυκνότητας του ασβεστίου προκαλεί την **υπερέκκριση** της **παραθορμόνης**.
- ❖ **Αύξηση** της πυκνότητας του **ιοντικού ασβεστίου** στο αίμα **αναστέλλει** την έκκριση της **ορμόνης**.



Θύμος αδένας

Ο Θύμος αδένας συμμετέχει στο **ανοσολογικό** σύστημα του οργανισμού.

Κατά την εμβρυϊκή ηλικία δημιουργεί τα αρχέγονα ανοσοκύτταρα από τα οποία προέρχονται τα ώριμα ανοσοκύτταρα και πιθανώς προκαλεί την ανοσολογική ωρίμανση των μικρών λεμφοκυττάρων.



Εκκρίνει
 μια λεμφοτρόπο ορμόνη
 μια πολυπεπτίδη → τη θυμοσίνη

Συγγενής **απλασία** του θύμου αδένα κατά την εμβρυϊκή ζωή ή **αφαίρεση** του θύμου αδένα οδηγεί σε **λεμφοπενία** με συνέπεια μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο.

Υπόφυση

Η υπόφυση είναι **ενδοκρινής** αδένας

Αποτελείται από δύο τμήματα:


τον πρόσθιο λοβό
ή αδενοϋπόφυση

Παράγει επτά
ορμόνες με
ξεχωριστή χημική
σύσταση και
βιολογική ενέργεια

Αδενοϋπόφυση

τον οπίσθιο λοβό
ή νευροϋπόφυση

Παράγει δύο ορμόνες
• Ωκυτοκίνη
**• Αντιδιουρητική
ορμόνη**



Ορμόνες οπίσθιου λοβού υπόφυσης


1. Ωκυτοκίνη

- Διεγέρει τη **μήτρα** της εγκύου προκαλώντας τις ρυθμιστικές συστολές στον τοκετό. **ΥΠΟΘΥΣΗ**

- Δρά στους **μαστούς**:



~ **άμεσα** για την παραγωγή γάλακτος κατά το θηλασμό και

~ **έμμεσα** με τη διέγερση του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης για παραγωγή προλακτίνης.



2. Αντιδιουρητική ορμόνη -ADH - ή Πιτρεασίνη

Δρά στα νεφρά καθιστώντας τα διαβατά στο νερό.



- Το οινόπνευμα → **ελαττώνει** την έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης

- η μορφίνη


- η νικοτίνη

- τα βαρβιτουρικά

- **αυξάνουν** την έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης

Ορμόνες ενδοκρινούς μοίρας παγκρέατος

Η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος αποτελείται από τα νησίδια του Langerhans.




Τα νησίδια αυτά απαρτίζονται από τρία είδη κυττάρων από τα οποία:

Τα κύτταρα α παράγουν και εκκρίνουν προς το αίμα το γλυκαγόνο ή γλυκαγόνη.

Τα κύτταρα β παράγουν και εκκρίνουν προς το αίμα την ινσουλίνη.

11

Επινεφρίδια




- Είναι δύο και βρίσκονται πάνω από κάθε νεφρό, στο ύψος του 1^{ου} οσφυϊκού σπονδύλου.
- Το καθένα ζυγίζει 5-7 γραμ.
- Αποτελούνται από δύο διαφορετικές από ιστολογικής πλευράς μοίρες:
 - ✓ **το φλοιό**
 - ✓ **το μυελό**

Ο φλοιός καταλαμβάνει το 90 % του αδένα και περιβάλει το μυελό που βρίσκεται στο κέντρο.

12

Ο φλοιός των επινεφριδίων εκκρίνει πάνω από 50 ορμόνες οι οποίες ονομάζονται:

κορτικοειδή ή
στερινοειδή ή
κορτικοστερινοειδή.



Ο μυελός παράγει δύο ορμόνες:

- την αδρεναλίνη και
- την νοραδρεναλίνη

οι οποίες ονομάζονται και κατεχολαμίνες

11